

Số: 02/TB-NNPTNT

Vũng Liêm, ngày 16 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

Về tình hình sâu bệnh và các biện pháp chăm sóc và bảo vệ cây trồng
trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn.

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

Theo số liệu các xã, thị trấn báo cáo đến ngày 08/01/2025 diện tích xuống giống vụ Đông xuân 2024-2025 là 8.250,55 ha, trà lúa đang ở giai mạ 787,3 ha, đoạn đẻ nhánh 3.465 ha, giai đoạn làm đồng 2.918,25 ha, thu hoạch 1.080 ha năng suất 5,24 tấn/ha. Lúa Hè Thu sớm xuống giống 1.035 ha giai đoạn mạ, gồm các xã Trung Chánh, Tân Quới Trung. Cây màu diện tích 1.142,9 ha, chủ yếu rau màu thực phẩm các loại (trong đó diện tích dưa hấu 72 ha): giai đoạn tăng trưởng, ra hoa, mang trái; Cây ăn trái diện tích 11.480 ha: gồm các loại cây chủ yếu như: Sầu riêng 1.263 ha, Bưởi 2.177 ha (Bưởi da xanh 1.954 ha), Xoài 995,8 ha, cam Sành 2.997 ha... Gồm các giai đoạn sinh trưởng, ra hoa, mang trái, thu hoạch.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI:

Theo số liệu của cộng tác viên BVTV-KN và công chức nông nghiệp các xã báo cáo ngày 08/01/2025 và kết quả điều tra dự tính dự báo của cán bộ Trạm Trồng trọt và BVTV hiện nay:

1. Trên lúa: Rầy nâu xuất hiện rải rác, mật số thấp 100-200 con/m²; Sâu cuốn lá diện tích nhiễm 245 ha, mật số 10-20 con/m², tuổi 5 – trưởng thành; Bệnh cháy lá: diện tích nhiễm 545 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, cấp bệnh 3-5; Bệnh cháy bìa lá diện tích nhiễm bệnh 363 ha, tỷ lệ bệnh 10-20%; Chuột hại lúa 35 ha, tỷ lệ gây hại 2-5%.

*Tình hình rầy nâu vào đèn từ ngày 25 đến 31/12/2024: Con/bẫy

Điểm đặt bẫy đèn	25/12	26/12	27/12	28/12	29/12	30/12	31/12
Trung Hiệp	133	526	675	650	557	550	1.360
Trung Thành Tây	0	0	0	0	0	7	18

2. Trên rau màu: Gây hại ở mức độ nhẹ, chủ yếu bệnh thán thư, cháy lá, bọ trĩ, sâu đục trái, sâu ăn tạp, rầy mềm.

3. Trên cây ăn trái: Trên cây ăn trái xuất hiện một số sâu, bệnh hại như: Bệnh cháy lá, bệnh chảy nhựa thân trên cây sầu riêng; bệnh thán thư trên xoài; bệnh vàng lá trên cây có múi, sâu đục trái bưởi, bệnh loét trên cam (do vi khuẩn), bệnh ghẻ trên cam (do nấm) ...

III. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, XÂM NHẬP MẶN VÀ THUỶ TRIỀU LÊN CAO:

Từ những ngày cuối tháng 12/2024 đến những ngày đầu tháng 01/2025 có những ngày trời âm u, nhiệt độ thấp xen kẽ với những ngày thời tiết có nắng ấm, ẩm độ không khí cao tạo điều kiện cho một số loại dịch hại phát triển gây hại trên cây trồng.

Tình hình xâm nhập mặn xuất hiện trên địa bàn huyện Vũng Liêm vào những ngày cuối tháng 12/2024 và đầu tháng 01/2025 với nồng độ cao nhất 4,5‰. Dự báo độ mặn xuất hiện cao nhất vào khoảng tháng 2-3/2025.

IV. GIẢI PHÁP CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ CÂY TRỒNG TRƯỚC TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN 2025:

Trước diễn biến tình hình thời tiết, thủy văn và diễn biến dịch hại nêu trên để đảm bảo công tác chăm sóc cây trồng, trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Ty 2025 được tốt nhằm bảo vệ năng suất, sản lượng, chất lượng các loại cây trồng theo kế hoạch. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vũng Liêm đề nghị UBND các xã, thị trấn khẩn trương tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Đối với sinh vật gây hại:

* **Trên cây lúa:** Cần lưu ý một số đối tượng gây hại chủ yếu:

- **Đối với rầy nâu hại lúa:** Rầy nâu thường gây hại cục bộ, nên kiểm tra kỹ đồng ruộng, nhất là giai đoạn lúa đồng-trổ, những nơi có nước, nên phát hiện sớm rầy nâu tuổi 1-2, mật số trên 3 con/tép thì sử dụng các loại thuốc trừ rầy nâu theo khuyến cáo để phun xịt ngay theo nguyên tắc 4 đúng. Những ruộng nào kiểm tra nếu mật số thấp (< 1 con/tép) thì không nên phun thuốc BVTV vì làm mất cân bằng sinh thái đồng ruộng dễ làm rầy nâu bộc phát, tái phát.

- **Đối với sâu cuốn lá:** Trà lúa Đông Xuân 2024-2025 và các xã xuống giống Hè Thu sớm vào tháng 01/2025: Trung Chánh, Tân Quới Trung nên kiểm tra và phun thuốc khi sâu non nở ra tuổi 2-3 và mật số ≥ 20 con/m² ở giai đoạn lúa làm đồng để bảo vệ lá đồng không làm ảnh hưởng năng suất lúa sau này.

- **Bệnh đạo ôn trên lúa:** Cần phải thăm đồng thường xuyên, khi phát hiện bệnh nên giữ nước trong ruộng đầy đủ, không phun thuốc kích thích sinh trưởng hay phân bón lá. Nên phun thuốc đặc trị để phòng trị theo nguyên tắc 4 đúng. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông có thể phun ngừa bằng các loại thuốc đặc trị khi lúa trổ lác đác (5%) và lặp lại khi trổ đều.

- **Đối với bệnh cháy bìa lá:** Đây là bệnh do vi khuẩn gây ra, thường xuất hiện sau đợt gió mạnh và ruộng bón thừa đạm, kiểm tra kỹ và phun thuốc đặc trị vi khuẩn.

***Chú ý:** Các giống lúa dễ nhiễm bệnh như: OM18, OM 4900, Đài thơm 8...có khi nhiễm cả 02 bệnh đạo ôn (do nấm) và cháy bìa lá (do vi khuẩn) cùng một lúc khi điều kiện thời tiết thuận lợi như đã nêu trên. Khi phát hiện triệu chứng gây hại cùng lúc cần phải phối hợp cả 02 loại thuốc trừ nấm và vi khuẩn để trừ cùng một lúc và phải giữ mực nước trong ruộng vừa đủ.

- **Đối với bệnh đốm vằn:** Thường bắt đầu xuất hiện khi lúa vào giai đoạn làm đồng, thăm đồng thường xuyên để phát hiện sớm phòng trị kịp thời. Chú ý bệnh gây hại bắt đầu từ bờ ruộng có nhiều cỏ dại rồi lây lan ra khu vực phía trong ruộng.

- **Đối với chuột hại lúa:** Đây là một loại dịch hại khó kiểm soát, phương châm là phải diệt chuột có tổ chức, diệt đồng loạt, diệt nhiều lần và áp dụng nhiều biện pháp

kết hợp bắt đầu ngay từ đầu vụ đến cuối vụ (tuyệt đối không dùng điện để diệt chuột). Chú ý diệt chuột trên cả các vườn cây ăn trái, cây lâu năm khác xen kẽ với ruộng sản xuất lúa.

***Trên cây rau màu:** Thường xuyên thăm đồng, vệ sinh đồng ruộng, tỉa cành lá thông thoáng, ưu tiên dùng thuốc sinh học, đảm bảo thời gian cách ly. Bón phân cân tăng cường sử dụng phân hữu cơ, hữu cơ sinh học kết hợp với phân bón N-P-K trung vi lượng hợp lý. Quản lý nước trên ruộng rau màu không để bị ngập úng, đảm bảo đủ nước tưới theo nhu cầu của từng loại rau màu.

***Trên cây ăn trái:**

Trồng cây với khoảng cách hợp lý, vệ sinh vườn cây thông thoáng, bón phân cân đối, tưới đủ ẩm vào mùa khô, thoát nước trong vườn tốt, tăng cường bón phân hữu cơ kết hợp với phân vô cơ cân đối, kiểm tra pH (độ chua) đất, phun thuốc đặc trị đúng từng loại sinh vật gây hại khi vừa chớm xuất hiện.

2. Đối với tình hình xâm nhập mặn và thủy triều dâng:

Cần theo dõi chặt chẽ thường xuyên thông tin về độ mặn qua hệ thống SMS, phương tiện truyền thanh, truyền hình trong mùa khô 2024-2025. Các xã quan tâm chỉ đạo công chức nông nghiệp, các ấp thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nắm chắc diễn biến tình hình xâm nhập mặn, thủy triều dâng và dịch hại trên cây trồng ... chỉ đạo điều tiết nước phù hợp cho từng giai đoạn tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thối nước gây ngập úng lúa, hoa màu của nông dân.

Đối với lúa dễ bị thiệt hại ở giai đoạn mạ và giai đoạn lúa trổ nếu độ mặn trên 1‰ không cho nước vào ruộng; khi sử dụng nước pha thuốc phun xịt thì nên sử dụng nước không nhiễm mặn (nhỏ hơn 0,5‰). Đối với rau màu hoa kiểng cần thận trọng hơn, có kế hoạch trữ nước ngọt để tưới. Đối với cây ăn trái, sầu riêng là cây nhạy cảm nhất đối với mặn nên cần theo dõi chặt chẽ và có kế hoạch trữ nước ngọt trong vườn để tưới trong thời gian mặn xâm nhập. Các cây ăn trái khác cũng chú ý không nên dùng nước nhiễm mặn (với độ mặn $\geq 2\text{‰}$) để pha thuốc phun hoặc tưới nhiều lần trong lúc mặn xâm nhập. Nên xử lý nước bị nhiễm mặn trước khi dùng để pha thuốc phun xịt cho cây.

Dựa trên cơ sở thông báo này, UBND các xã, thị trấn thông báo rộng rãi đến nông dân và cử cộng tác viên, công chức nông nghiệp theo dõi đồng ruộng để chủ động phòng trừ kịp thời bảo vệ tốt năng suất, sản lượng lúa, rau màu và cây ăn trái trước trong và sau tết Nguyên đán 2025 theo kế hoạch./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HU, UBND huyện;
- BLĐ phòng NN&PTNT;
- Trạm TT&BVTV, Trạm KN;
- Lưu.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Lê Văn Dứt